Zospeum lautum Frauenf.
,, amoenum Frauenf.
Spelaeoconcha paganettii Stur.

Fam. Auriculidae.

Alexia[11]) myosotis Drap.
,, biasolettiana Küst.
Alexia denticulata Mont.
,, kutschigiana Küst.
,, microstoma Küst.
,, obsoleta L. Pfr.
Ovatella bivonae Phil.
Marinula firmini Payr.

B. **Pneumonopoma.**

Fam. Acmeidae.

Acme (Platyla) polita Hartm.
,, ,, banatica Rossm.
,, ,, gracilis Cless.
,, ,, oedogyra Pal.
,, ,, perpusilla Reinh.
,, ,, similis Reinh.
,, ,, stussineri O. Bttg.
,, ,, trigonostoma Pal.
,, ,, wilhelmi Wagn.
,, (Auricella) lineata Drap.
,, (Megalacme) spectabilis Rossm.
,, ,, pironae Poll.
,, ,, veneta Pir.
,, ,, kobelti Wagn.

Fam. Truncatellidae.

Truncatella truncata Mont.

Fam. Pomatiasidae.

Pomatias (Eupomatias) henricae Strob.
Pomatias (Eupomatias braueri Wagn.
,, ,, cinerascens Rossm.
,, ,, elegans Cless.
,, ,, scalarinus Villa.
,, ,, septemspiralis Raz.
,, Rhabdotacra) apricus Mouss.
Auritus (Auritus) philippianus Gredl.
,, ,, porroi Strob.
,, ,, gracilis Pfr.
,, ,, sturanyi Wagn.
,, ,, tergestinus West.
,, ,, waldemari Wagn.
,, ,, dalmaticus Pfr.
,, ,, nanus West.
,, ,, kleciaki M. Br.
,, (Titanopoma) auritus Rossm.

Fam. Cyclostomatidae.

Ericia elegans Müll.
,, costulata Ziegl.

Die Clausilien einiger Taunus-Ruinen.

Von

Caesar R. Boettger.

In früheren Jahren besuchte ich regelmässig mehrmals im Jahre die Ruinen des Taunus, um dort immer eine reiche Ausbeute an Schnecken zu machen. Hier auf den alten Burgen entfaltet sich ein überreiches Molluskenleben, während der Taunus sonst allgemein nicht reich an Konchylien ist. Die Hauptmasse einer solchen Fauna bilden natürlich die Clausilien. Es dürfte vielleicht manchem, besonders Frankfurter Konchylienfreunden, angenehm sein, wenn ich hier meine Sammelergebnisse in Clausilien aufzähle, besonders da es scheint, als ob in der Literatur einige Fehler untergelaufen wären.

---

[11]) Alexia Leach braucht nicht in Phytia Gray (doch wohl sicher nur ein Druckfehler für Pythia Bolt.) umgeändert zu werden, da von den Entomologen allgemein Sphaerosoma Leach statt Alexia Steph. gesetzt wird.

1. Eppstein.

Balea perversa L.
Cl. (Alinda) biplicata Mont.
Cl. (Pirostoma [Kuzmicia]) dubia Drap.
Cl. (Pirostoma [Kuzmicia]) bidentata Ström.
Cl. (Pirostoma [Pirostoma]) plicatula Drap.

2. Königstein.

Balea perversa L.
Cl. (Alinda) biplicata Mont.
Cl. (Pirostoma [Kuzmicia[) parvula Stud.
Cl. (Pirostoma [Kuzmicia[) dubia Drap.
Cl. (Pirostoma (Kuzmicia[) bidentata Ström.

3. Falkenstein.

Balea perversa L.
Cl. (Alinda) biplicata Mont.
Cl. (Pirostoma [Kuzmicia]) parvula Stud.
Cl. (Pirostoma [Kuzmicia]) bidentata Ström.
Cl. (Pirostoma [Pirostoma]) plicatula Drap.

4. Hattstein.

Balea perversa L.
Cl. (Clausiliastra [Marpessa]) laminata Mont.
Cl. (Alinda) biplicata Mont.
Cl. (Pirostoma [Kuzmicia]) bidentata Ström.
[Cl. (Pirostoma [Pirostoma]) lineolata Held.]

5. Reiffenberg.

Balea perversa L.
Cl. (Alinda) biplicata Mont.
Cl. (Pirostoma [Kuzmicia]) dubia Drap.
Cl. (Pirostoma [Kuzmicia]) bidentata Ström.

Clausilia (Alinda) plicata Drap., von der Kobelt in seiner „Fauna der Nassauischen Mollusken“ pag. 155 als Fundorte die Ruinen Königstein und Hattstein angibt, habe ich dort nicht gefunden. Mein nächster Fundort ist die Rheinebene (Oppenheim, Ins. Kühkopf*), Biebrich, Bingen etc.). Clessin schreibt pag. 293 seines Buches „Deutsche Excursions-Mollusken-Fauna“ meinen Sammelergebnissen entsprechend richtig „im Taunus vollständig fehlend.“

Clausilia (Pirostoma [Pirostoma]) lineolata Held von der Ruine Hattstein habe ich in Klammern gesetzt, da ich die Art nicht lebend, sondern nur in zwei stark verwitterten Gehäusen gefunden habe. Kobelt schreibt in seiner „Fauna der Nassauischen Mollusken“ pag. 157 „. . . . in wenigen Exemplaren von Heynemann auf dem Hattsteiner Schloss im Taunus gefunden“ und in seinem „Ersten Nachtrag zur Fauna der Nassauischen Mollusken“ aus den Jahrbüchern des Nassauischen Vereins für Naturkunde 1886 auf pag. 13 „Auf dem Hattstein nicht wiedergefunden, wohl aber auf dem Falkenstein (Henssler)“. Auf der Ruine Falkenstein habe ich weder tote noch lebende Exemplare gefunden. Natürlich soll damit nicht jedes Vorkommen dieser Art auf dem Falkenstein geleugnet werden, wie überhaupt in diesen Listen nur meine eigenen Sammelergebnisse aufgezählt sind.

---

*) An dieser Stelle sei auf einen Druckfehler in meiner Fauna des Kühkopfs (Nachrichtsblatt 1906, pag. 17—19) aufmerksam gemacht. Auf pag. 18 steht auf Zeile 25 Clausilia (Alinda) plicatula Drap. statt Clausilia (Alinda) biplicata Mont.